

STRANTEL® XL CHIENS COMPRIMÉS

Identification

Dénomination du médicament vétérinaire

STRANTEL® XL CHIENS COMPRIMÉS

Forme pharmaceutique

Comprimé

Composition

Principes actifs

Nom du principe actif	Quantité de principe actif
Praziquantel	175 mg
Pyrantel (sous forme d'embonate)	175 mg
Fébantel	525 mg

Informations supplémentaires

Comprimé oblong, de couleur jaune, avec une barre de sécabilité sur les deux faces.
Les comprimés peuvent être divisés en deux parties égales.

Usage clinique

Indications d'utilisation par espèce

Espèce(s)	Utilisation
Chien	Chez les chiens adultes: - Traitement des infestations mixtes par les nématodes et cestodes des espèces suivantes : Nématodes : - <u>Ascaridés</u> : <i>Toxocara canis</i>, <i>Toxascaris leonina</i> (formes adultes et immatures tardives). - <u>Ankylostomes</u> : <i>Uncinaria stenocephala</i>, <i>Ancylostoma caninum</i> (adultes). - <u>Trichures</u> : <i>Trichuris vulpis</i> (adultes). Cestodes : - <u>Ténias</u> : <i>Echinococcus</i> spp. (<i>E. granulosus</i>, <i>E. multilocularis</i>), <i>Taenia</i> spp., (<i>T.hydatigena</i>, <i>T. pisiformis</i>, <i>T. taeniformis</i>), <i>Dipylidium caninum</i> (formes adultes et immatures).

Contre-indications

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients.

Ne pas utiliser pendant le 1^{er} et le 2^{ème} tiers de gestation (voir rubrique « Utilisation en cas de gestation et de lactation ou de ponte »).

Précautions et mises en garde

Mise en garde particulière à chaque espèce cible

Les puces servent d'hôtes intermédiaires pour un type fréquent de ténia - *Dipylidium caninum*. Une infestation par un ténia réapparaîtra certainement si un contrôle des hôtes intermédiaires tels que les puces, les souris, etc ... n'est pas entrepris.

Précautions particulières pour une utilisation sûre chez les espèces cibles

Une résistance des parasites à n'importe quelle classe d'anthelminthique peut se développer suite à une utilisation fréquente ou répétée d'un anthelminthique de cette classe.

Afin de minimiser le risque de ré-infestation et de nouvelle infestation, les fèces doivent être ramassées et éliminées de manière appropriée pendant 24 heures après le traitement.

Précaution particulière à prendre par la personne qui administre le médicament

En cas d'ingestion accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice.

Par mesure d'hygiène, les personnes administrant les comprimés directement au chien ou les ajoutant à sa nourriture, doivent se laver les mains après l'administration.

Précautions particulières concernant la protection de l'environnement

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Autres précautions

Le produit est efficace contre *Echinococcus spp.*, qui n'est pas présent dans tous les Etats membres de l'UE mais qui devient plus fréquent dans certains états. L'échinococcose représente un danger pour l'homme. L'échinococcose est une maladie à déclaration obligatoire auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Des directives spécifiques sur le traitement et le suivi, ainsi que la protection des personnes, doivent être obtenues auprès de l'autorité compétente concernée.

Interactions et cas particuliers

Utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte

Des effets tératogènes attribués à l'administration de fortes doses de fébantel pendant les premiers stades de la gestation ont été rapportés chez le rat, le mouton et le chien

L'innocuité du produit dans le premier et deuxième tiers de gestation n'a pas été étudiée. Ne pas utiliser le produit chez les chiennes gestantes durant le premier et deuxième tiers de gestation (voir rubrique « Contre-indications »).

L'innocuité d'un traitement unique pendant le dernier tiers de la gestation ou pendant l'allaitement a été établie.

Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions

Ne pas utiliser simultanément avec de la pipérazine car les effets anthelminthiques du pyrantel et de la pipérazine peuvent être antagonistes.
L'utilisation simultanée d'autres composés cholinergiques peut être toxique.

Effets indésirables et surdosage

Incompatibilité majeure

Sans objet.

Effets indésirables

Dans de très rares cas, des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) ont été observés.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :

- très fréquent (effets indésirables chez plus d’1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d’un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés).

Posologie

Espèce(s)	Posologie
Chien	Pour administration orale uniquement. Pour garantir l’administration d’une dose correcte, le poids corporel doit être déterminé aussi précisément que possible. <u>Posologie</u> : Pour le traitement des chiens, 1 comprimé par 35 kg de poids corporel (15 mg de fébantel, 14,4 mg d’embonate de pyrantel et 5 mg de praziquantel / kg de poids corporel).

Espèce(s)	Posologie																				
	<u>Les posologies sont les suivantes :</u> <table><tr><th>Poids corporel (kg)</th><th>Comprimés</th></tr><tr><td>Environ 17,5 kg</td><td>1/2 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS</td></tr><tr><td>31-35 kg</td><td>1 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS</td></tr><tr><td>> 35-40 kg</td><td>1 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS + 1/2 de STRANTEL COMPRIMES POUR CHIENS</td></tr><tr><td>> 40-45 kg</td><td>1 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS + 1 de STRANTEL COMPRIMES POUR CHIENS</td></tr><tr><td>> 45-50 kg</td><td>1 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS + 1,5 de STRANTEL COMPRIMES POUR CHIENS</td></tr><tr><td>> 50-55 kg</td><td>1 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS + 2 de STRANTEL COMPRIMES POUR CHIENS</td></tr><tr><td>> 55-60 kg</td><td>1 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS + 2,5 de STRANTEL COMPRIMES POUR CHIENS</td></tr><tr><td>> 60-65 kg</td><td>1 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS + 3 de STRANTEL COMPRIMES POUR CHIENS</td></tr><tr><td>> 65-70 kg</td><td>2 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS</td></tr></table> Les comprimés peuvent être donnés directement au chien ou dissimulés dans la nourriture. Il n'est pas nécessaire que l'animal soit à jeun avant ou après le traitement. Les comprimés doivent être administrés en une prise unique. Les demi-comprimés non utilisés doivent être immédiatement jetés ou replacés dans la plaquette entamée jusqu'à utilisation. S'il y a un risque de ré-infestation, demander conseil au vétérinaire sur la nécessité et la fréquence d'une administration répétée.	Poids corporel (kg)	Comprimés	Environ 17,5 kg	1/2 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS	31-35 kg	1 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS	> 35-40 kg	1 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS + 1/2 de STRANTEL COMPRIMES POUR CHIENS	> 40-45 kg	1 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS + 1 de STRANTEL COMPRIMES POUR CHIENS	> 45-50 kg	1 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS + 1,5 de STRANTEL COMPRIMES POUR CHIENS	> 50-55 kg	1 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS + 2 de STRANTEL COMPRIMES POUR CHIENS	> 55-60 kg	1 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS + 2,5 de STRANTEL COMPRIMES POUR CHIENS	> 60-65 kg	1 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS + 3 de STRANTEL COMPRIMES POUR CHIENS	> 65-70 kg	2 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS
Poids corporel (kg)	Comprimés																				
Environ 17,5 kg	1/2 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS																				
31-35 kg	1 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS																				
> 35-40 kg	1 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS + 1/2 de STRANTEL COMPRIMES POUR CHIENS																				
> 40-45 kg	1 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS + 1 de STRANTEL COMPRIMES POUR CHIENS																				
> 45-50 kg	1 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS + 1,5 de STRANTEL COMPRIMES POUR CHIENS																				
> 50-55 kg	1 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS + 2 de STRANTEL COMPRIMES POUR CHIENS																				
> 55-60 kg	1 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS + 2,5 de STRANTEL COMPRIMES POUR CHIENS																				
> 60-65 kg	1 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS + 3 de STRANTEL COMPRIMES POUR CHIENS																				
> 65-70 kg	2 de STRANTEL XL COMPRIMES POUR CHIENS																				

Temps d'attente

Voie d'administration

- Orale

Conservation et stockage

Température de conservation

Non renseigné

Précautions particulières de conservation selon pertinence

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.
Chaque fois qu'un demi-comprimé inutilisé est conservé, il doit être replacé dans la plaquette puis inséré dans la boîte.
Conserver la plaquette dans la boîte en carton.

Précaution particulière à prendre lors de l'élimination

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Informations commerciales

Présentation	Accessible au groupement	Classement du médicament en matière de délivrance	Numéro d'autorisation de mise sur le marché
STRANTEL® XL CHIENS Boîte de 2 comprimés pelliculés sécables	Oui	Non renseigné	FR/V/4126166 8/2013

Informations de révision

Date de révision de la notice

01/01/1970

Responsabilités

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

CHANELLE PHARMACEUTICALS MANUFACTURING LIMITED
DUBLIN ROAD, LOUGHREA - CO. GALWAY IRLANDE

<https://chanellepharma.com/>

Responsable de la mise sur le marché

LABORATOIRE PERRIGO FRANCE
(Gamme Clément -Thékan)
20, rue André Gide
B.P. 80
92321 CHATILLON CEDEX

<https://www.clement-thekan.fr/>

Responsable de la pharmacovigilance

LABORATOIRE PERRIGO FRANCE

(Gamme Clément -Thékan)

20, rue André Gide

B.P. 80

92321 CHATILLON CEDEX

<https://www.clement-thekan.fr/>