



Se connecter

Générer le PDF de la notice

# MILBEMAXTAB™ 12,5 mg/125 mg Comprimés pour chiens

## Identification

### Dénomination du médicament vétérinaire

MILBEMAXTAB™ 12,5 mg/125 mg Comprimés pour chiens

### Forme pharmaceutique

Comprimé

## Composition

### Principes actifs

Nom du principe actif	Quantité de principe actif
Milbémycine oxime	12.5 mg/comprimé

Praziquantel	125 mg/comprimé
--------------	-----------------

## Excipients

<b>Nom de l'excipient</b>
Cellulose microcristalline
Croscarmellose sodique
Povidone
Lactose monohydraté
Silice colloïdale anhydre
Stéarate de magnésium

## Informations supplémentaires

Comprimé rond, blanc, gravé « CCA » sur un côté et « NA » de l'autre.

## Usage clinique

### Indications d'utilisation par espèce

Espèce(s)	Utilisation
Chien	<p>Chez les chiens infestés ou à risque d'infestations mixtes par des cestodes, des nématodes gastro-intestinaux, du ver oculaire, des vers pulmonaires et/ou du ver du cœur. Ce médicament vétérinaire est indiqué uniquement en cas d'infestations concomitantes par des cestodes et des nématodes ou de prévention concomitante de la dirofilariose cardiaque/angiostrongylose.</p> <p><u>Cestodes</u>            Traitement des vers plats: <i>Dipylidium</i></p>

*caninum*, *Taenia* spp., *Echinococcus* spp., *Mesocestoides* spp.

#### Nématodes gastro-intestinaux :

Traitement des :

Ankylostomes : *Ancylostoma caninum*,

Ascarides : *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*,

Trichures : *Trichuris vulpis*.

#### Ver oculaire

Traitement de *Thelazia callipaeda* (voir modalités d'administration à la rubrique «Voies d'administration et posologie»).

#### Vers pulmonaires

Traitement de :

*Angiostrongylus vasorum* (réduction de l'infestation par les stades parasitaires adultes immatures (L5) et adultes ; voir modalités d'administration et de prévention de la maladie à la rubrique «Voies d'administration et posologie »),

*Crenosoma vulpis* (réduction de l'infestation).

#### Ver du cœur

Prévention de la dirofilariose cardiaque (*Dirofilaria immitis*), si un traitement concomitant contre des cestodes est indiqué.

## **Contre-indications**

Ne pas utiliser chez les chiens pesant moins de 5 kg.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients.

Voir également rubrique "Précautions particulières d'emploi".

## Précautions et mises en garde

### **Mise en garde particulière à chaque espèce cible**

La possibilité que les autres animaux du même foyer puissent être une source de ré-infestation doit être prise en compte, et ils doivent être traités avec un médicament vétérinaire adapté.

Quand l'infestation par le cestode *D. caninum* est confirmée, un traitement concomitant contre les hôtes intermédiaires, tels que les puces et les poux, doit être discuté avec le vétérinaire afin de prévenir la ré-infestation.

Des cas de résistance parasitaire à une classe d'anthelminthique peuvent apparaître après usages fréquents ou répétés d'un anthelminthique de cette classe.

Une utilisation non raisonnée des antiparasitaires ou s'écartant des recommandations du RCP peut augmenter la pression de sélection de résistance et entraîner une diminution de l'efficacité. La décision d'utiliser le médicament vétérinaire doit être fondée sur l'identification des espèces parasites et l'évaluation de leur charge, ou du risque d'infestation sur la base de leurs caractéristiques épidémiologiques, pour chaque animal.

En l'absence de risque de co-infestation avec les nématodes ou les cestodes, un médicament vétérinaire à spectre étroit doit être utilisé.

Des cas de résistance de *Dipylidium caninum* au praziquantel, des cas de multirésistance d'*Ancylostoma caninum* à la milbémycine oxime et des cas de résistance

de *Dirofilaria immitis* aux lactones macrocycliques ont été rapportés.

En cas de suspicion de résistance, il est recommandé d'investiguer avec des méthodes diagnostiques appropriées. Les cas confirmés de résistance doivent être rapportés au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou aux autorités compétentes.

L'utilisation du médicament vétérinaire doit prendre en compte les informations locales sur la sensibilité des parasites ciblés, si disponibles.

### **Précautions particulières pour une utilisation sûre chez les espèces cibles**

Le traitement de chiens porteurs d'un nombre élevé de microfilaires circulantes peut parfois conduire à l'observation de réactions d'hypersensibilité telles que : muqueuses pâles, vomissements, tremblements, essoufflements ou salivation excessive. Ces réactions sont dues à la libération de protéines lors de la mort des microfilaires et non à un effet toxique du médicament vétérinaire. Le traitement des chiens porteurs de microfilaires circulantes n'est, par conséquent, pas recommandé.

Dans les régions concernées par la dirofilariose cardiaque ou en cas de traitement d'un chien ayant voyagé dans ces régions, l'utilisation du médicament vétérinaire doit faire l'objet d'une consultation vétérinaire afin d'exclure l'infestation par *Dirofilaria immitis*. En cas de diagnostic positif, un traitement par un adulticide est indiqué avant l'administration du médicament vétérinaire.

Aucun essai n'a été réalisé sur des chiens sévèrement débilisés ou ayant une atteinte rénale ou hépatique importante. Dans ce type de cas, l'utilisation du

médicament vétérinaire n'est pas recommandée ou seulement après évaluation du rapport bénéfice/risque par le vétérinaire responsable.

Chez les chiens âgés de moins de 4 semaines, l'infestation par des cestodes est rare. Par conséquent, le traitement de ces animaux par un médicament vétérinaire combiné peut ne pas être nécessaire.

Certaines études ont montré que la marge de sécurité de la milbémycine oxime est plus basse chez certains chiens de la race Colley et des races apparentées. Pour ces races de chiens, il est recommandé d'observer strictement la posologie.

La tolérance du médicament vétérinaire n'a pas été étudiée chez les jeunes chiots de la race Colley et des races apparentées.

Les signes cliniques en cas de surdosage sont identiques chez les chiens de la race Colley à ceux observés pour les autres races de chiens (voir rubrique « Symptômes de surdosage »).

### **Précaution particulière à prendre par la personne qui administre le médicament**

Se laver les mains après usage.

En cas d'ingestion accidentelle de comprimés, en particulier par un enfant, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquette.

### **Précautions particulières concernant la protection de l'environnement**

Voir la rubrique "Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments".

### **Autres précautions**

L'Echinococcose présente un danger potentiel pour l'homme. L'Echinococcose est une maladie à déclaration

obligatoire selon l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OMSA) et à ce titre, les protocoles spécifiques en termes de traitement, de suivi et de sécurité des personnes doivent être récupérés auprès de l'autorité compétente appropriée (e.g. experts ou centre de parasitologie).

## Interactions et cas particuliers

### **Utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte**

#### Gestation et lactation:

Le médicament vétérinaire peut être utilisé pendant la gestation et la lactation.

#### Fertilité:

Le médicament vétérinaire peut être utilisé chez les animaux destinés à la reproduction.

### **Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions**

L'administration concomitante du médicament vétérinaire avec la sélamectine est bien tolérée.

Aucune interaction n'a été observée en cas d'administration à la dose recommandée d'une lactone macrocyclique, type sélamectine, lors du traitement avec le médicament vétérinaire à la dose recommandée.

En l'absence d'autres études, une attention particulière doit être prise en cas d'administration concomitante avec d'autres lactones macrocycliques.

De plus, aucune étude de ce type n'a été réalisée sur des animaux reproducteurs.

## Effets indésirables et surdosage

### **Incompatibilité majeure**

Sans objet.

## Effets indésirables

Chiens :

Très rare (<1 animal / 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés):	Troubles du tube digestif (tels que diarrhée, salivation et vomissement) Réactions d'hypersensibilité Troubles neurologiques (tels qu'ataxie et tremblements musculaires) Troubles systémiques (tels qu'anorexie et léthargie)
--	---

Il est important de notifier les effets indésirables. La notification permet un suivi continu de l'innocuité d'un médicament vétérinaire. Les notifications doivent être envoyées, de préférence par l'intermédiaire d'un vétérinaire, soit au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à son représentant local, soit à l'autorité nationale compétente par l'intermédiaire du système national de notification. Voir la notice pour les coordonnées respectives.

## Posologie

Espèce(s)	Posologie
Chien	Le sous-dosage peut conduire à un manque d'efficacité et favoriser le développement de résistance. Afin d'assurer l'administration d'une dose correcte, le poids doit être déterminé aussi précisément que possible.

La dose minimale recommandée est de 0,5 mg de milbémycine oxime et 5 mg de praziquantel par kg de poids corporel, en une seule prise.

Le médicament vétérinaire doit être administré pendant ou après le repas. En fonction du poids du chien, la dose à administrer est la suivante :

Poids	Nombre de comprimés
5 - 25 kg	1 comprimé
> 25 - 50 kg	2 comprimés
> 50 - 75 kg	3 comprimés

Dans le cadre de la prévention de la dirofilariose cardiaque et si, en même temps, un traitement contre les cestodes est nécessaire, le médicament vétérinaire peut tenir lieu de traitement destiné à la prévention de la dirofilariose cardiaque.

Pour le traitement des infestations à *Angiostrongylus vasorum*, la milbémycine oxime doit être administrée 4 fois à une semaine d'intervalle. En cas de traitement concomitant contre les cestodes, il est recommandé de traiter une fois avec le médicament vétérinaire et de continuer avec un médicament vétérinaire monovalent à base de milbémycine oxime seule pour les trois semaines de traitement

restantes.

Dans les régions endémiques, en cas de traitement concomitant contre les cestodes, une administration du médicament vétérinaire toutes les 4 semaines permet de prévenir l'angiostrongylose en réduisant la charge parasitaire en adultes immatures (L5) et adultes.

Pour le traitement des infestations à *Thelazia callipaeda*, la milbémycine oxime doit être administrée en 2 prises à 7 jours d'intervalle. En cas de traitement concomitant contre les cestodes, le médicament vétérinaire peut remplacer un médicament vétérinaire monovalent à base de milbémycine oxime seule.

## Temps d'attente

### **Voie d'administration**

Orale

## Conservation et stockage

### **Température de conservation**

À conserver à une température ne dépassant pas 30 °C.

### **Précautions particulières de conservation selon pertinence**

Conserver le conditionnement primaire dans l'emballage extérieur de façon à protéger de la lumière.

### **Précaution particulière à prendre lors de l'élimination**

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères

Le médicament vétérinaire ne doit pas être déversé dans les cours d'eau car cela pourrait mettre les poissons et autres organismes aquatiques en danger.

Utiliser les dispositifs de reprise mis en place pour l'élimination de tout médicament vétérinaire non utilisé ou des déchets qui en dérivent, conformément aux exigences locales et à tout système national de collecte applicable au médicament vétérinaire concerné.

## Informations commerciales

<b>Présentation</b>	<b>Accessible au groupement</b>	<b>Classement du médicament en matière de délivrance</b>	<b>Numéro d'autorisation de mise sur le marché</b>
Boîte de 1 plaquette thermoformée de 2 comprimés secs	Non	Non soumis à prescription	FR/V/1300038 3/2010

## Informations de révision

### **Date de révision de la notice**

01/01/1970

## Responsabilités

### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le**

## **marché**

### **ELANCO**

*Heinz-Lohmann-Strasse 4  
27472 Cuxhaven  
Allemagne*

## **Responsable de la mise sur le marché**

### **ELANCO FRANCE**

*Crisco Uno, Bâtiment C  
3-5 avenue de la Cristallerie  
92310 Sèvres - France  
<http://www.elanco.fr>*

## **Responsable de la pharmacovigilance**

### **ELANCO FRANCE**

*Crisco Uno, Bâtiment C  
3-5 avenue de la Cristallerie  
92310 Sèvres - France  
+33 1 55 49 35 29  
<http://www.elanco.fr>*

## **MedVet**

Le MedVet, recueil des médicaments vétérinaires mis à jour quotidiennement par les laboratoires.

### **— En savoir plus**

© COPYRIGHT 2026 - Tous droits réservés

Inscription à la newsletter

Courriel\*

[Plan du site](#)

[Produits](#)

[Laboratoire](#)

[Mentions légales](#)

[Politique de confidentialité](#)

[Espace laboratoire](#)

S'inscrire

Vous pouvez vous opposer au suivi de votre navigation sur ce site web. Cela protégera votre vie privée, mais empêchera également le propriétaire d'apprendre de vos actions et de créer une meilleure expérience pour vous et les autres utilisateurs.

**Vous n'êtes pas exclu(e). Décochez cette case pour vous exclure.**