

MedVet



SIMV

SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU
MÉDICAMENT ET DIAGNOSTIC VÉTÉRINAIRES

Produits

Laboratoires

Se connecter

Générer le PDF de la notice

MILBEMAXTAB™ 16 mg/40 mg comprimés pelliculés pour chats

Identification

Dénomination du médicament vétérinaire

MILBEMAXTAB™ 16 mg/40 mg comprimés pelliculés pour chats

Forme pharmaceutique

Comprimé pelliculé

Composition

Principes actifs

Nom du principe actif	Quantité de principe actif
Milbémycine oxime	16 mg/comprimé
Praziquantel	40 mg/comprimé

Excipients

Nom de l'excipient	Quantité de l'excipient
Cellulose microcristalline	-
Stéarate de magnésium	
Croscarmellose sodique	
Povidone	
Lactose monohydraté	
Silice colloïdal anhydre	
Hypromellose	
Macrogol 8000	
Talc	
Oxyde de fer rouge (E 172)	0.213 mg/comprimé
Arôme artificiel de boeuf	

Informations supplémentaires

Comprimé pelliculé rouge à rouge-brun, oblong à l'arôme artificiel de bœuf, avec une barre de sécabilité sur les deux faces, gravé « KK » d'un côté, « NA » de l'autre.

Usage clinique

Indications d'utilisation par espèce

Espèce(s)	Utilisation
Chat	Chez les chats infestés ou à risque

d'infestations mixtes par des cestodes, des nématodes gastro-intestinaux et/ou du ver du cœur. Ce médicament vétérinaire est indiqué uniquement en cas d'infestations concomitantes par des cestodes et des nématodes ou de prévention concomitante de la dirofilariose cardiaque.

Cestodes

Traitement des vers plats :

Dipylidium caninum,

Taenia spp.,

Echinococcus multilocularis

Nématodes gastro-intestinaux

Traitement des :

Ankylostomes : *Ancylostoma tubaeforme*

Ascarides : *Toxocara cati*

Ver du cœur

Prévention de la dirofilariose cardiaque (*Dirofilaria immitis*), si un traitement concomitant contre des cestodes est indiqué.

Contre-indications

Ne pas utiliser chez les chats de moins de 2 kg.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients.

Précautions et mises en garde

Mise en garde particulière à chaque espèce cible

La possibilité que les autres animaux du même foyer puissent être une source de ré-infestation doit être prise en

compte, et ils doivent être traités avec un médicament vétérinaire adapté.

Il est recommandé de traiter de façon concomitante tous les animaux vivant dans le même foyer.

Quand l'infestation par le cestode *D. caninum* est confirmée, un traitement concomitant contre les hôtes intermédiaires, tels que les puces et les poux, doit être discuté avec le vétérinaire afin de prévenir la ré-infestation.

Une utilisation non raisonnée des antiparasitaires ou s'écartant des recommandations du RCP peut augmenter la pression de sélection de résistance et entraîner une diminution de l'efficacité. La décision d'utiliser le médicament vétérinaire doit être fondée sur l'identification des espèces parasites et l'évaluation de leur charge, ou du risque d'infestation sur la base de leurs caractéristiques épidémiologiques, pour chaque animal.

En l'absence de risque de co-infestation avec les nématodes ou les cestodes, un médicament vétérinaire à spectre étroit doit être utilisé.

L'utilisation du médicament vétérinaire doit prendre en compte les informations locales sur la sensibilité des parasites ciblés, si disponibles.

Précautions particulières pour une utilisation sûre chez les espèces cibles

S'assurer que les chats et les chatons pesant entre 0,5 et 2 kg reçoivent le comprimé de dosage approprié (4 mg milbémycine oxime / 10 mg praziquantel) et la dose appropriée. Voir également la rubrique 3.9.

Aucun essai n'a été réalisé sur des chats sévèrement débilités ou ayant une atteinte rénale ou hépatique importante. Dans ce type de cas, l'utilisation du

médicament vétérinaire n'est pas recommandée ou seulement après évaluation du rapport bénéfice/risque par le vétérinaire responsable.

Précaution particulière à prendre par la personne qui administre le médicament

Se laver les mains après usage.

En cas d'ingestion accidentelle de comprimés, en particulier par un enfant, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquette.

Précautions particulières concernant la protection de l'environnement

Voir rubrique " Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments".

Autres précautions

L'Echinococcose présente un danger potentiel pour l'homme. L'Echinococcose est une maladie à déclaration obligatoire selon l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OMSA) et à ce titre, les protocoles spécifiques en termes de traitement, de suivi et de sécurité des personnes doivent être récupérés auprès de l'autorité compétente appropriée (e.g. experts ou centre de parasitologie).

Interactions et cas particuliers

Utilisation en cas de grossesse, de lactation ou de ponte

Gestation et lactation :

Le médicament vétérinaire peut être utilisé pendant la gestation et la lactation.

Fertilité :

Le médicament vétérinaire peut être utilisé chez les animaux destinés à la reproduction.

Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions

L'administration concomitante du médicament vétérinaire avec la sélamectine est bien tolérée.

Aucune interaction n'a été observée en cas d'administration à la dose recommandée d'une lactone macrocyclique, type sélamectine, lors du traitement avec le médicament vétérinaire à la dose recommandée.

Bien que non recommandée, l'utilisation concomitante du médicament vétérinaire avec un spot-on contenant de la moxidectine et de l'imidaclopride aux doses recommandées en une seule application a été bien tolérée lors d'une étude de laboratoire portant sur 10 chatons. La sécurité et l'efficacité de l'utilisation concomitante n'a pas été évaluée lors d'essais terrain. En l'absence d'autres études, une attention particulière doit être prise en cas d'administration concomitante avec toute autre lactone macrocyclique. De plus, aucune étude de ce type n'a été réalisée sur des animaux reproducteurs.

Effets indésirables et surdosage

Incompatibilité majeure

Sans objet.

Effets indésirables

Très rare (<1 animal / 10 000 animaux traités, y	Troubles du tube digestif (tels que diarrhée, vomissement)
---	---

compris les cas isolés):	Réactions d'hypersensibilité Troubles neurologiques (tels qu'ataxie et tremblements musculaires) Troubles systémiques (tels que léthargie)
--------------------------	--

Il est important de notifier les effets indésirables. La notification permet un suivi continu de l'innocuité d'un médicament vétérinaire. Les notifications doivent être envoyées, de préférence par l'intermédiaire d'un vétérinaire, soit au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à son représentant local, soit à l'autorité nationale compétente par l'intermédiaire du système national de notification. Voir la notice pour les coordonnées respectives.

Posologie

Espèce(s)	Posologie		
Chat	<p>Afin d'assurer l'administration d'une dose correcte, le poids corporel doit être déterminé aussi précisément que possible. La dose minimale recommandée est de 2 mg de milbémycine oxime par kg de poids corporel et 5 mg de praziquantel par kg de poids corporel, en une seule prise. Le médicament vétérinaire doit être administré pendant ou après le repas, afin de permettre une protection optimale contre la dirofilariose cardiaque.</p> <p>En fonction du poids du chat, la dose à administrer est la suivante :</p> <table border="1" data-bbox="518 1998 1166 2040"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		

Poids	Nombre de comprimés
2 - 4 kg	½ comprimé
> 4 - 8 kg	1 comprimé
> 8 - 12 kg	1 ½ comprimé

Le médicament vétérinaire peut être intégré dans un programme de prévention de la dirofilariose cardiaque, si un traitement concomitant contre des cestodes est indiqué. Le médicament vétérinaire administré chaque mois permet la prévention de la dirofilariose cardiaque. Pour une prévention de la dirofilariose cardiaque en continu, il est préférable d'utiliser une monosubstance.

Temps d'attente

Voie d'administration

Orale

Conservation et stockage

Température de conservation

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Précautions particulières de conservation selon pertinence

Conserver le conditionnement primaire dans l'emballage extérieur de façon à protéger de la lumière.

Précaution particulière à prendre lors de

l'élimination

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Le médicament vétérinaire ne doit pas être déversé dans les cours d'eau car cela pourrait mettre les poissons et autres organismes aquatiques en danger.

Utiliser les dispositifs de reprise mis en place pour l'élimination de tout médicament vétérinaire non utilisé ou des déchets qui en dérivent, conformément aux exigences locales et à tout système national de collecte applicable au médicament vétérinaire concerné.

Informations commerciales

Présentation	Accessible au groupement	Classement du médicament en matière de délivrance	Numéro d'autorisation de mise sur le marché
Boîte de 2 comprimés pelliculés sécables	Oui	Non soumis à prescription	FR/V/9099646 1/2010

Informations de révision

Date de révision de la notice

01/01/1970

Responsabilités

Titulaire de l'autorisation de mise sur le

marché

ELANCO

*Heinz-Lohmann-Strasse 4
27472 Cuxhaven
Allemagne*

Responsable de la mise sur le marché

ELANCO FRANCE

*Crisco Uno, Bâtiment C
3-5 avenue de la Cristallerie
92310 Sèvres - France
<http://www.elanco.fr>*

Responsable de la pharmacovigilance

ELANCO FRANCE

*Crisco Uno, Bâtiment C
3-5 avenue de la Cristallerie
92310 Sèvres - France
+33 1 55 49 35 29
<http://www.elanco.fr>*

MedVet

Le MedVet, recueil des médicaments vétérinaires mis à jour quotidiennement par les laboratoires.

— En savoir plus

© COPYRIGHT 2026 - Tous droits réservés

Inscription à la newsletter

Courriel*

[Plan du site](#)

[Produits](#)

[Laboratoire](#)

[Mentions légales](#)

[Politique de confidentialité](#)

[Espace laboratoire](#)

S'inscrire

Vous pouvez vous opposer au suivi de votre navigation sur ce site web. Cela protégera votre vie privée, mais empêchera également le propriétaire d'apprendre de vos actions et de créer une meilleure expérience pour vous et les autres utilisateurs.

Vous n'êtes pas exclu(e). Décochez cette case pour vous exclure.