

Dénomination du médicament

BUCCOBET 0,1 mg, comprimé à sucer
Valérate de bétaméthasone

Encadré

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que BUCCOBET 0,1 mg, comprimé à sucer et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BUCCOBET 0,1 mg, comprimé à sucer ?
3. Comment prendre BUCCOBET 0,1 mg, comprimé à sucer ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver BUCCOBET 0,1 mg, comprimé à sucer ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE BUCCOBET 0,1 mg, comprimé à sucer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : CORTICOISTEROIDES POUR LE TRAITEMENT ORAL LOCAL ? code ATC : A01 AC.

Ce médicament est préconisé dans les aphtes, les inflammations de la bouche, des gencives ou de la gorge.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BUCCOBET 0,1 mg, comprimé à sucer ?

Ne prenez jamais BUCCOBET 0,1 mg, comprimé à sucer

- Chez l'enfant de moins de 6 ans.
- Si vous êtes allergique à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez des lésions buccales dues à un virus (herpès buccal, varicelle).

Avertissements et précautions

Il est impératif de respecter les posologies prescrites par votre médecin ainsi que les conditions d'utilisation de ce médicament.

Si les lésions s'étendent, comme en cas d'apparition de fièvre : **CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.**

Si vous avez un phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale) adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Sportifs

L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et BUCCOBET 0,1 mg, comprimé à sucer

Sans objet.

BUCCOBET 0,1 mg, comprimé à sucer avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Votre médecin peut être amené à prescrire ce médicament au cours de la grossesse. L'utilisation de ce médicament doit être évitée lors de l'allaitement.

D'une façon générale il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

BUCCOBET 0,1 mg, comprimé à sucer contient du lactose.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE BUCCOBET 0,1 mg, comprimé à sucer ?

Posologie

Sucer lentement les comprimés, sans les croquer, ni les avaler, jusqu'au délitement complet.

5 à 10 comprimés par jour, en répartissant les prises.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE OU PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRECISE :

- IL NE PEUT PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS.
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.

DANS TOUT LES CAS SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Mode et voie d'administration

Voie buccale.

Durée du traitement

Se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

Si vous avez pris plus de BUCCOBET 0,1 mg, comprimé à sucer que vous n'auriez dû :

Sans objet.

Si vous oubliez de prendre BUCCOBET 0,1 mg, comprimé à sucer :

Sans objet.

Si vous arrêtez de prendre BUCCOBET 0,1 mg, comprimé à sucer :

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde :

- Rarement : candidoses (affections dues à des champignons microscopiques) de la bouche ou du pharynx régressant à l'aide d'un traitement approprié.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet :

www.signalement-sante.gouv.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER BUCCOBET 0,1 mg, comprimé à sucer ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

CE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ À UNE TEMPÉRATURE INFÉRIEURE À 25°C

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient BUCCOBET 0,1 mg, comprimé à sucer

- La substance active est :

Valérate de bétaméthasone.....	0,122
mg	
(Quantité correspondante en bétaméthasone à.....	0,100
mg)	

Pour un comprimé à sucer.

- Les autres composants sont : lactose monohydraté, gomme arabique, stéarate de magnésium.

Qu'est-ce que BUCCOBET 0,1 mg, comprimé à sucer et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de comprimé à sucer sous plaquette thermoformée.
Boîte de 50 comprimés.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

SCA PHARMA

20 RUE GEORGES HUCHON
94300 VINCENNES

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

DB PHARMA

LA VARENNE SAINT-HILAIRE
1 B, AVENUE DU COMMANDANT RIVIERE
94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Fabricant

LABORATOIRES MACORS

RUE DES CAILLOTTES
Z.I PLAINE DES ISLES
89000 AUXERRE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).