

**Dénomination du médicament**

**CARBOLEVURE ADULTES, gélule**  
**Levure déshydratée, Charbon activé**

**Encadré**

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 2 jours.

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que CARBOLEVURE ADULTES, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARBOLEVURE ADULTES, gélule ?
3. Comment prendre CARBOLEVURE ADULTES, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARBOLEVURE ADULTES, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## **1. QU'EST-CE QUE CARBOLEVURE ADULTES, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique : Charbon médicinal en association, - code ATC : A07BA51  
Les substances actives de CARBOLEVURE sont la levure déshydratée et le charbon activé.  
Ce médicament est indiqué chez l'adulte :

- en cas de digestion difficile, notamment avec ballonnement intestinal.
- en complément de la réhydratation et/ou des mesures diététiques, dans le traitement symptomatique d'un épisode de la diarrhée.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARBOLEVURE ADULTES, gélule ?**

**Ne prenez jamais CARBOLEVURE ADULTES, gélule :**

- si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre CARBOLEVURE.

**Faites attention avec CARBOLEVURE ADULTES, gélule :**

### **Mises en garde spéciales**

**En cas de diarrhée, vous devez consulter rapidement votre médecin dans les cas suivants :**

- en l'absence d'amélioration au bout de 3 jours de traitement,
- en cas d'apparition de fièvre supérieure à 39°C ou de vomissement,
- en cas de présence de sang ou de glaires dans les selles,
- en cas de douleurs à l'estomac anormalement élevées,
- en cas de soif intense, de sensation de langue sèche. En effet, ces signes montrent un début de déshydratation c'est à dire de perte importante de liquide due à la diarrhée. Votre médecin jugera alors de la nécessité de prescrire une réhydratation qui pourra se faire par voie orale ou par voie intraveineuse.

### **Précautions d'emploi**

- En cas de ballonnement, flatulences, éviter les légumes secs (lentilles, flageolets, pois ) ainsi que certains légumes verts (choux, choux-fleur, brocoli, pain au son ou complet ).
- En cas de diarrhée, il est nécessaire de :
  - o Se réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée (la ration quotidienne moyenne en eau de l'adulte est de 2 litres).
  - o S'alimenter le temps de la diarrhée,

§ en excluant certains apports et particulièrement les crudités, les fruits non pelés, les plats épicés, ainsi que les aliments ou boissons glacés.

§ en privilégiant les viandes maigres, les pommes de terre et le riz.

Un apport hydrique et électrolytique adéquat doit être envisagé, en particulier chez les patients âgés.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A CONSULTER VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

#### **Enfants et adolescents**

Sans objet.

#### **Autres médicaments et CARBOLEVURE ADULTES, gélule**

Ce médicament pouvant diminuer l'absorption d'autres médicaments, il convient de prendre CARBOLEVURE, par mesure de précaution, à distance de tout autre médicament (plus de 2 heures si possible).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

#### **CARBOLEVURE ADULTES, gélule avec des aliments et boissons et de l'alcool**

Sans objet.

#### **Grossesse et allaitement**

Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

#### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

#### **CARBOLEVURE ADULTES, gélule contient**

Sans objet.

### **3. COMMENT PRENDRE CARBOLEVURE ADULTES, gélule ?**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

#### **Posologie**

##### **Réservé à l'adulte.**

La dose recommandée est de 3 gélules par jour.

#### **Mode et voie d'administration**

Voie orale.

Avaler les gélules sans les ouvrir avec un verre d'eau.

#### **Durée du traitement**

La durée du traitement est de 3 jours.

Si les symptômes persistent ou s'aggravent, un avis médical est requis.

**Si vous avez pris plus de CARBOLEVURE ADULTES, gélule que vous n'auriez dû**

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

La prise de doses élevées de CARBOLEVURE peut entraîner une constipation. Le traitement sera symptomatique. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous oubliez de prendre CARBOLEVURE ADULTES, gélule**

Sans objet.

**Si vous arrêtez de prendre CARBOLEVURE ADULTES, gélule**

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Informez immédiatement votre médecin si vous remarquez l'un des effets indésirables suivants, car vous pourriez avoir besoin traitement médical d'urgence :**

- Réaction allergique soudaine et sévère avec difficultés à respirer, gonflement, vertiges, battements cardiaques rapides, transpiration et perte de connaissance (voir « Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARBOLEVURE ADULTES, gélule »).

Les autres effets secondaires qui peuvent survenir sont :

Fréquence inconnue (la fréquence ne peut pas être estimée à partir des données disponibles)

- Noircissement des selles.
- Éruption cutanée ou démangeaison ou éruption cutanée avec démangeaison..

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet :

[www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER CARBOLEVURE ADULTES, gélule ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP.  
La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

### Ce que contient CARBOLEVURE ADULTES, gélule

- Les substances actives :

Levure déshydratée vivante contenant au minimum  $10^8$  cellules de *Saccharomyces cerevisiae*  
par gramme ..... 108,5 mg

Charbon activé... . . . . . 109,0 mg

Pour une gélule n°1.

- Les autres composants sont :

Povidone, silice colloïdale.

Composition de l'enveloppe de la gélule :

- o tête : oxyde de fer noir - dioxyde de titane ? gélatine.

- o Corps : érythrosine ? oxyde de fer rouge ? dioxyde de titane ? gélatine.

### Qu'est-ce que CARBOLEVURE ADULTES, gélule et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de gélule. Boîte de 20, 30, 40 ou 60 gélules.  
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

**PIERRE FABRE MEDICAMENT**

LES CAUQUILLOUS

81500 LAVAUUR

### Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

**PIERRE FABRE MEDICAMENT**

PARC INDUSTRIEL DE LA CHARTREUSE

81100 CASTRES

### Fabricant

**PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION**

ETABLISSEMENT PROGIPHARM  
RUE DU LYCEE  
45500 GIEN

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

**Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).